

# Lineas de ayuda

## \* Centro de Salud N° 42

Calle 149 e/35 y 36

Tel: 221 4798399

## \* Centro de Salud N° 28

Av. 13 e/ 495 y 496

Tel: 221 4711068

## \* Centro de Salud N° 7

Av. 7 Esq. 82

Tel: 221 4532585

## \* Centro de Salud N° 6

Av. 122 e/ 80 y 81

Tel: 221 4520077

Dosis: \_\_\_\_\_

Cantidad de pastillas	Hora de administración	Control
4		
4		
4		



Colegio de  
Farmacéuticos  
LA PLATA

# Lineas de ayuda

## \* Hospital San Roque

Calle 508 e/18 y 19

Consejeria de Derechos Sexuales

Tel: 221 3142205 (whatsapp)

## \* Hospital Rossi

Calle 37 e/116 y 117 N° 183

Tel: 221 4828821/4247598

## \* Hospital San Martín

Av. 1 Esq. 70

Tel: 221 421195/99

## \* Hospital Sor María Ludovica

Calle 14 N° 1631

Tel: 221 4535901 al 10/912/3

## \* Hospital Elina de La Serna de Montes de Oca

Calle 8 e/41 y 42

Tel: 221 4212729/4833869

## \* Hospital Dr. Alejandro Korn

Av. 520 e/ 173 y 178

Tel: 221 4780281

## \* Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez

Diag. 114 e/ 39 y 40

Tel: 221 4215241

## \* Hospital Dr. José Ingenieros

Calle 161 Esq. 514

Tel: 221 4785800/86004

## \* UPA 6

Av. 66 Esq. 153

## \* Centro de Salud N° 41

Calle 84 e/ 131 y 132

Tel: 221 4861832

## Atención farmacéutica

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

IVE


## ¿Qué es el misoprostol?

El Misoprostol es un medicamento que permite interrumpir un embarazo de forma segura, produciendo contracciones en el útero que provocan la expulsión de su contenido. Dando lugar a un sangrado similar a la menstruación

Con la información y las indicaciones brindadas por el equipo de salud se puede utilizar hasta las 12 semanas de gestación.


Generalmente no requiere internación.

Para interrumpir un embarazo de menos de 12 semanas se deben administrar 800mcg (4 comprimidos de 200mcg) cada 3 horas hasta la expulsión



## Formas de administración

### Uso Sublingual



- 1 - Colocar 4 pastillas debajo de la lengua y mantenerlas ahí durante media hora. Si luego de media hora no se disolvieron totalmente, tragar lo que queda con un poco de agua
- 2 - 3 horas después colocar 4 pastillas debajo de la lengua y repetir el procedimiento
- 3 - Por último 3 horas después repetir el procedimiento

### Uso Vaginal



- 1 - Colocar 4 pastillas en la vagina. empujar de a una hasta el fondo. Se sugiere recostarse y hacer reposo entre 30 minutos y una hora para que las mismas no se caigan
  - 2 - 3 horas después, colocar otras 4 pastillas dentro de la vagina y repetir el reposo
  - 3 - Por último, 3 horas después colocar otras 4 pastillas dentro de la vagina y realizar el reposo.
- Si en el momento en que hay que poner las pastillas se está con sangrado abundante, esperar a que disminuya un poco aunque esto signifique retrasar la colocación

## Prevención y manejo del dolor

Tomar Ibuprofeno 400 a 600 mg 30 a 45 minutos antes del procedimiento. Se puede repetir la dosis de 400 mg cada 4hs. o de 600 mg cada 6hs. según dolor hasta que cese el mismo.

No tomar Paracetamol ni Aspirina

## Complicaciones

En caso de presentarse alguno de estos síntomas acercarse a la guardia del hospital

- \* Fiebre un día después de realizar el procedimiento
- \* Dolor abdominal fuerte que no mejora después de tomar analgésicos
- \* Sangrado importante, es decir, si empapa más de 2 toallitas femeninas por hora durante más de 2hs. consecutivas
- \* Sangrado abundante repentino, después de que este disminuyó o se detuvo durante varios días luego del procedimiento

## Contraindicaciones

- \* Sospecha de embarazo ectópico
- \* Antecedentes de reacción alérgica al misoprostol

**Ante cualquier eventualidad acudir a una guardia hospitalaria**