

LA PLATA, 17 de Abril 2026

CIRCULAR 111

INTEGRAL GILSA (ex OSPOCE Integral): Cambios en la norma de atención

Se actualizaron los siguientes puntos en la norma de atención:

- Recetarios válidos para todos los planes.
- Credenciales vigentes.

Para ver Norma de Atención, [Clic aquí.](#)

CIRCULAR 112

PAMI: Campaña Vacunación Antineumocócica y segunda tanda Antigripal

La CoFA ha comunicado que comenzó la distribución de la segunda tanda de dosis de vacunas para la Campaña PAMI 2026.

Se están distribuyendo, entre las farmacias de la Red COLFARMA, dosis de vacunas FLUAD (Apartir de 65 años), INFLUVAC y PREVENAR 20.

Una vez recibidas las dosis se debe dar ingreso a las mismas a través de SIAFAR (Colfarma OnLine > SIAFAR > PAMI > Vacunación).

IMPORTANTE – Pautas de vacunación antineumocócica:

A- PERSONAS SIN ANTECEDENTE DE HABER RECIBIDO ESQUEMA SECUENCIAL PREVIAMENTE

1. **Personas de 5 a 64 años con enfermedades crónicas con mayor riesgo de desarrollo de ENI y/o inmunocompromiso, fístula líquido cefalorraquídeo (LCR) e implante coclear.**

El esquema de vacunación es de 1 (una) dosis de VCN20

2. **Personas de 65 años y mayores**

El esquema de vacunación es de 1 (una) dosis de VCN20

3. **Personas receptoras de trasplante de células hematopoyéticas (TCH)**

El esquema completo es de 4 dosis:

– 3 dosis de VCN20 con un intervalo interdosis de 4 semanas, comenzando la vacunación entre los 3 y 6 meses post TCH.

– 1 dosis de refuerzo de VCN20 a partir de los 6 meses de la tercera dosis o 12 meses del TCH (lo que ocurra más tarde).

B -PERSONAS CON ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA PREVIA, SEGÚN VACUNA Y DOSIS RECIBIDAS

Para las personas incluidas en la población objetivo que hayan recibido vacunas contra neumococo se recomienda continuar el esquema según lo detallado en la tabla 2.

Tabla 2. Recomendaciones para la vacunación de personas con vacunación previa (indistintamente de la cantidad de dosis recibidas)

	Antecedente de vacunación	Esquema propuesto	Esquema alternativo*
5 a 17 años inclusive con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI, fistula de LCR o implante coclear	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	VPN23 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VCN13-VPN23	No requiere dosis adicional	
5 a 17 años HIC	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VCN13-VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 5 años de la última dosis antineumocócica	
18 a 64 años con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 12 meses	VPN23 1 dosis con intervalo ≥ 12 meses**
	VPN23	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 12 meses	
	VCN13 - VPN23	No requiere dosis adicional**	
18 a 64 años HIC, fistula de LCR y/o implante coclear	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 12 meses	-
	VPN23		-
	VCN13 - VPN23	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 5 años de última dosis	-
65 años y más	VCN13	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 12 meses	-
	VPN23		-
	VCN13 - VPN23 (recibidas antes o después de los 65 años)	1 dosis VCN20 con intervalo ≥ 5 años de última dosis	-

HIC: Huéspedes inmunocomprometidos (según lo expuesto en tabla 1); VCN13: Vacuna conjugada contra neumococo de 13 serotipos; VCN20: Vacuna conjugada contra neumococo de 20 serotipos; VPN23: Vacuna polisacárida contra neumococo de 23 serotipos.

(*) Aquellas personas con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI que recibieron VCN13 previamente, pueden recibir como esquema alternativo la vacuna VPN23 si estuviera disponible, como se describe en esta columna. Se recomienda idealmente continuar esquema con VCN20 en personas con inmunocompromiso y mayores de 65 años.

(**) Aquellas personas de 18 a 64 años con riesgo aumentado de ENI que recibieron esquema secuencial VCN13 – VPN23, se recomienda 1 (una) dosis de VCN20 a partir de los 65 años con un intervalo de al menos 5 años respecto a la última dosis de vacuna antineumocócica.

Si alguna persona con indicación de esquema secuencial (que presente una o más de las comorbilidades arriba descritas) hubiese recibido anteriormente VPN23 deberá respetarse los siguientes intervalos mínimos según la edad para recibir VCN13:

Menores de 18 años: 8 semanas

Mayores de 18 años: 12 meses

Todo niño o niña entre 2 y 5 años deberá contar con esquema completo de vacuna contra neumococo con VCN13. Quienes no lo certifiquen deberán recuperar esquemas. Si están comprendidos en los grupos de riesgo, deberán completar con VPN23 para cumplir con el esquema secuencial.

Para ver y descargar en archivo PDF estas pautas de la vacunación, [Clic aquí.](#)

CIRCULAR 113

RECONQUISTA ART: CONVENIO VIGENTE

Recordamos que Reconquista ART es un convenio del Colegio de Provincia que se encuentra vigente. Para ver norma [Clic aquí](#)

CIRCULAR 114

VACUNA ANTIGRIPAL 2026

Adjuntamos archivo con TODAS las campañas informadas hasta a la fecha [Clic aquí](#)

CIRCULAR 115

SCIS UNIFICADO: Actualización de Vademecums

Se informa que la obra social SCIS UNIFICAD a partir del 10 de abril, actualizó los siguientes vademécums:

ANTICONCEPTIVOS [\(Clic aquí\)](#)

PLAN 40% [\(Clic aquí\)](#)

PLAN P 40% [\(Clic aquí\)](#)

PLAN 50% [\(Clic aquí\)](#)

PLAN PMI [\(Clic aquí\)](#)

CIRCULAR 116

UNLP – Actualización del Vademécum

La Obra Social UNLP actualizó el Vademécum. Para ver el mismo, [Clic aquí](#)